

Hvorlang tid skal der gå fra blodfortyndende er givet, til der kan anlægges/fjernes epi/spinal

- 1) Udregn døgndosis
 - 2) Find døgndosis i skema
 - 3) Aflæs hvormange timers pause i skema
- Dette er pausen uanset størrelsen på den sidst givne dosis

| Tid fra medicin til instrumentering i ryg | | Døgndosis | Pause |
|---|---------------------------|-----------------|---------------|
| | Innohep | ≤ 3.500 IE | |
| Tinzaparin | > 3.500 og ≤ 4.500 | | min 10 timers |
| | > 4.500 | | min 20 timers |
| Fragmin | ≤ 2.500 IE | | Ingen |
| Dalteparin | > 2.500 og ≤ 5.000 | | min 10 timers |
| | > 5.000 | | min 20 timers |
| Klexane | ≤ 20 mg | | Ingen |
| Enoxaprin | > 20 og ≤ 30 | | min 10 timers |
| | > 30 | | min 20 timers |

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Tid fra instrumentering i ryg til medicin givning | uanset dosis | 2-4 timer |
|---|--------------|-----------|

Tid = fra sidste indgift, uanset dosis
(fx hvis døgndosis er delt med 2)

Instrumentering i ryg = anlæggelse eller fjernelse af epiduralkateter eller anlæggelse af spinal

https://www.dsth.dk/pdf/Rapporter_retningslinjer/03_GRAVID.pdf?e=2589360/7542775

| TROMBOCYTTER | COMFORT | MORBIDITY | MORTALITY |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| EPIDURAL | 100 | 80 | 50 |
| | | | |
| SPINAL | 100 | 50 | 30 |

<http://www.dasaim.dk/wp-content/uploads/2017/08/Pr%C3%A6klampsi-guideline-PDF-dasair>
p. 26

|

1-2017-sept.pdf